

FOSFOZIL® Fosforo

8-24-0

NUTRICIÓN
CON FUERZA
Y CALIDAD
PARA TODOS
LOS CULTIVOS

COMPOSICIÓN PORCENTUAL Análisis Garantizado

Nitrógeno (N) como proteína hidrolizada. No menos de	08.34
Fosforo (P) como proteína hidrolizada. No menos de	24.71
Fitohormonas (Auxinas, Giberelinas, Citoquininas). No menos de	00.32
Extractos Orgánicos como Metabolitos Primarios:	
Aminoácidos Quelatados en EDTA. No menos de	06.82
Ácido Láctico, Fructosa, Flavonoides. No menos de	02.24
Inertes y/o Diluyentes	57.57
TOTAL	100.00

FOSFOZIL® Fosforo 8-24-0 Excelente Biofortificante Nutricional de fosforo bioactivado en metabolitos primarios; el complemento ideal que representa una base nutritiva favorable, para obtener energía fotosintética, absorción de nutrientes, promoción de floración, maduración de frutos, desarrollo radicular, crecimiento vegetativo y fisiológico de la planta; manteniendo activa las células y evitando envejecimiento prematuro para alcanzar mayor productividad. Su balance de compuestos en aminoácidos incrementa la acción del fósforo para transferir las sustancias elaboradas de la raíz a las paredes de las células y tejidos de vegetativos garantizando robustez y vitalidad.

OSFOZIL® Fosforo 8-24-0 Excelente Biofortificante Nutricional de fosforo bioactivado en metabolitos primarios; el complemento ideal que representa una base nutritiva favorable, para obtener energía fotosintética, absorción de nutrientes, promoción de floración, maduración de frutos, desarrollo radicular, crecimiento vegetativo y fisiológico de la planta; manteniendo activa las células y evitando envejecimiento prematuro para alcanzar mayor productividad. Su balance de compuestos en aminoácidos incrementa la acción del fósforo para transferir las sustancias elaboradas de la raíz a las paredes de las células y tejidos de vegetativos garantizando robustez y vitalidad.

FOSFOZIL® Fosforo 8-24-0 Por su tecnología RegeneXT, ejerce un efecto en la rizosfera desarrollando actividad biológica, química y física; esenciales para el reclutamiento de microorganismos beneficios para las plantas o cultivos, atrayendo interacciones mutualistas para mejorar el crecimiento y desarrollo de la planta a través de capacidades de adquisición de nutrientes, favoreciendo la capacidad de intercambio catiónico, transferencia de energía y respiración celular. Por su composición equilibrada, evita formación de compuestos insolubles, mismos que ocasionan taponamientos en los sistemas de fertirrigación.

FOSFOZIL® Fosforo 8-24-0 Esta diseñado para aplicarse en el momento que se tienen plantas o cultivos en desarrollo, crecimiento o fructificación solo o junto con los fertilizantes que comúnmente se usa, por lo tanto este producto es altamente compatible y queda a criterio del aplicador combinarlo (incluyendo calcos).

FOSFOZIL® Fosforo 8-24-0 Viene en forma líquida y puede ser aplicado sólo o combinado con otros plaguicidas en aspersiones terrestres. Para efecto correctivo indagarse de la dosis correcta con el ingeniero en campo.

APLICACIÓN RECURRENTE	DOSIS RECOMENDADA
Frutales, aguacate, vid, piña, cítricos, mango, papayo, durazno, manzana, nogal, zarzamora, fresa, frambuesa, arándano	40, 60 y 80 L/ha Aplicación dirigida al suelo, en sistemas de riego inyectar aplicando la dosis por ha. - Etapa de inicio del cultivo: Durante el desarrollo hasta la prefloración (dividir de 3 a 4 aplicaciones). - Etapa de desarrollo del cultivo: Realizar tres aplicaciones en Drench, la primera en floración; la segunda y tercera con un intervalo de 15 días. Durante el desarrollo hasta la prefloración (dividir de 3 a 4 aplicaciones).
Hortalizas (tomate, chile, melón, calabaza, sandía, papa, brócoli)	Aplicación de 60, 80 y 100 L/ha, desde 5 días después del trasplante, o al momento de la siembra en el caso de la papa, repetir cada semana o cada 15 días y durante la floración, aplicar de manera inicial 20 L por ha en cualquiera de los sistemas.
Maíz, sorgo, cereales, garbanzo, arroz, caña de azúcar, trigo, frijol	Realizar aplicaciones de 30, 40 y 50 L/ha. en Drench, en momentos clave a los 5 o 10 días después de la siembra, a los 20 a 25 días de emergencia, en hoja 3 y 4 extendidas (maíz), al momento o inicio del llenado.
Cultivos en general	En aplicación foliar, aplicar desde los 10 días después de la emergencia (o trasplante) o durante el desarrollo vegetativo. Disuelto en 400 L de agua.



NOVATEAM

