



COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Análisis Garantizado

Complejo Antibiótico Botánico Thymus vulgaris (Tomillo). No menos de	05,62
Complejo Antibacteriano Botánico Atropa belladonna (Belladona). No menos de	04,37
Complejo Bacteriostático Botánico Anthemis nobilis (Manzanilla). No menos de	04,08
Metabolitos secundarios de levaduras benéficas. No menos de	01,52
Complejos Bioelementales como ácidos carboxílicos. No menos de	01,26
Betainas como bloques de compuestos. No menos de	00,91
Extractos Botánicos Coloidales EDTA como Diluyentes	82,24
TOTAL	100,00

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS

NOBACTER® Ultra Es un potente bactericida de origen botánico el cual tiene acción sistémica y de contacto del grupo activo de las antracilinas, de uso preventivo y correctivo, contra infecciones de bacterias fitopatógenas que atacan hojas, tallos, flores, frutos y tubérculos. Su modo de acción es inhibiendo la biosíntesis de proteínas precursoras de enzimas bacterianas degenerativas de los tejidos vegetales; además de tener un amplio rango de acción controlando bacterias grampositivas y gramnegativas.

NOBACTER® Ultra Se puede utilizar para el control de enfermedades causadas por hongos del género Alternaria sp, Cercospora sp, Aspergillus sp y Penicillium sp y en enfermedades causadas por bacterias de los generos Xanthomonas sp, Pseudomonas sp y Erwinia sp. Ya que los ingredientes activos de NOBACTER® Ultra penetra y actúa sobre la membrana celular y enzimas metabólicas de las fitobacterias.

Inhibe el desarrollo del patógeno con su acción multifocal impidiendo que la bacteria pueda protegerse o desarrollar resistencia. Al intervenir en estas estructuras y material genético, inhibe eficazmente el crecimiento y desarrollo de las poblaciones bacterianas. Así como también previene y bloquea de forma efectiva evitando que los síntomas de la enfermedad se manifiesten en tus cultivos, asegurando la salud y el vigor de la planta. Además, gracias a que las pulitonas son de origen natural, no generan resistencia y son fácilmente asimiladas por la planta.

Su perfecta formulación y tecnología RegeneXT NOBACTER® Ultra vigoriza y mantiene activa las células para alcanzar mayor productividad incrementando la acción de transferencia de sustancias a las paredes de las células y los tejidos de absorción. Por ser un bioproducto totalmente orgánico, NOBACTER® Ultra no genera saturaciones por moléculas sintéticas y tampoco modificaciones fisiológicas; por tal situación, al considerarse la composición de biomoléculas, es un producto regenerativo en cultivos o plantas de alta productividad y no ejerce alteraciones o daños sistemáticos bioquímicamente directos. Además tiene la ventaja de poseer cero residualidad a corte/cosecha, tiempo de reentrada y hacia el ser humano. Toxicidad mínima o nula.

NOBACTER® Ultra Viene en forma líquida y esta diseñado para aplicarse en el momento que se tienen las primeras hojas o raíces, solo o junto con protectantes, curativos o fertilizantes que comúnmente se usa en aspersiones terrestres o foliares, por lo tanto, este producto es altamente compatible y queda a criterio del aplicador combinarlo (incluyendo calcio, fungicidas y/o bactericidas). Para efecto correctivo indagarse de la dosis correcta con el ingeniero en campo.



NOVATEAM

INSTRUCCIONES DE USO .

APLICACIÓN RECURRENTE	DOSIS RECOMENDADA
Frutales, Cítricos, Mango, Papaya.	0,5 a 1,5 L/ha. Aplicación foliar en primeras apariciones observables de bacterias. 4 L/ha. Aplicación vía riego durante la floración cada año para prevención.
Nogal, Manzana, Durazno, Kiwi y Vid.	0,5 L/ha. Aplicación foliar de control preventivo. 1 L/ha. Aplicación foliar en control de curativo de infección repetir a los 10 días.
Arándano, Zarcamora, Fresa, Frambuesa, Mora	0,5 a 2 L/ha. Aplicación foliar en primeras infecciones y repetir a los 8 días.
Maíz, Sorgo, Garbanzo, Arroz, Trigo, Frijol, Soya, Ejote, Cacahuete.	0,5 a 2 L/ha. Aplicación foliar a principios de amacollamiento o de 20 a 30 cm de altura. repetir a los 15 o 20 días después como prevención de lo contrario al observar presencia de bacterias.
Caña de Azúcar, Banano, Piña, Agave.	0,75 a 1,5 L/ha. Aplicación foliar solo o en combinación con fertilizantes o protectantes. 5 L/ha. Aplicación vía riego durante el control de curación o prevención.
Pepino, Melón, Sandía, Calabaza y Calabacita.	0,5 a 1,5 L/ha. Aplicación foliar, en primeras infecciones, repetir cada 5 días. 4 L/ha. Aplicación vía riego de prevención o curativo en raíz.
Tomate, Chile, Berenjena, Cultivos en general.	0,75 a 1,5 L/ha. Aplicación foliar, repetir 3 veces cada 8 días. 5 L/ha. Aplicación vía riego después del trasplante, desarrollo de frutos o alta salinidad.

ALTO. LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Durante el manejo de este producto use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. El equipo que utilice para las aplicaciones de uso agrícola debe reservarlo exclusivamente para este propósito. Llene el recipiente del equipo de aplicación siempre a favor del viento y con el equipo y protección puesto; del mismo modo haga las aspersiones. Mezclar con un agitador de madera u otro material apropiado. No trate de destapar las boquillas con la boca. No se aplique este producto en los cultivos recomendados, cuando estén asociados otros cultivos susceptibles. No permita que el viento lleve aspersión hacia otros cultivos. Después de la jornada de trabajo, lave el equipo de aplicación con agua y jabón suficiente. El producto sobrante consérvelo en su envase original, manteniendo éste bien cerrado y en un lugar bajo llave. Una vez vació el envase, no vuelva a utilizarlo; destrúyalo.

PRECAUCIÓN DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO. 1.NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO. 2.NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES. 3.MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. 4.LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS. 5.NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN. 6.NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO. 7.LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO. 8.AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA. 9.NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL. 10.NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS. USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO. 11.NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE LA ETIQUETA. PRIMEROS AUXILIOS. Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, recostándola en un lugar ventilado, abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Si el producto cae en los ojos, lávese por lo menos durante 15 minutos con agua limpia; si cae sobre la piel, lave la parte afectada con agua y jabón, y quite a la persona intoxicada la ropa contaminada. Si el producto ha sido ingerido y la persona está consciente, provoque el vómito inmediatamente, introduciendo el dedo a la garganta o proporcionando agua tibia salada. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, NO PROVOQUE EL Vómito y no trate de introducir absolutamente nada por la boca. RECOMENDACIONES AL MÉDICO SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN.

Irritación en la piel, ojos, aparato respiratorio y tracto gastrointestinal. A grandes dosis ulceraciones de boca y faringe, esofagitis, vómito, diarrea, dolor abdominal, acidosis metabólica, daño tóxico hepático, renal y de SNC, ataxia miotoma. Puede causar daño irreversible a los ojos.

TRATAMIENTO Y ANTÍDOTO. Lavar por completo al individuo contaminado con abundante agua y jabón, si penetró a los ojos lavarlos por espacio de 15 minutos dirigiendo el chorro de agua hacia el ángulo interno con los ojos abiertos. En caso de ingestión, hacer un lavado gástrico, instilar 40 g de carbón activado en 200 ml. De agua y provocar catarsis con sulfato de sodio 15 g. en 200 ml. De agua. No usar grasa, aceites, leches o crema para inducir el vómito. MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. Durante el manejo del producto, evite la contaminación de suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, no lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos. Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a lo establecido en la ley general para la prevención y gestión integral de los residuos, su reglamento o al plan de manejo de envases vacíos de plaguicidas registrado ante la SEMARNAT. El uso inadecuado de este producto puede contaminar el agua subterránea, evite manejarlo cerca de los pozos de agua y no lo aplique en donde el nivel de los mantos acuíferos sea poco profundo (75 cm. De profundidad) y los suelos sean muy permeable (arenosos). En caso de derrames deberá usar equipo de protección personal y recuperar el producto derramado con algún material absorbente (por ejemplo tierra o arcilla), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y llevarlo al centro de acopio de residuos peligrosos autorizado más cercano.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE. Aunque es un producto natural e inofensivo a la salud humana y animales, no se almacene junto a los alimentos. Consérvese en su envase original cerrado y con etiqueta mientras no se usa. GARANTÍA: Como Almacenamiento y aplicación esta fuera de nuestro alcance de supervisión, declinamos cualquier responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por un mal uso o mal interpretación. Por lo que la garantía se reduce al contenido y la calidad del producto. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Evite tirar envases vacíos y contaminar aguas de ríos, arroyos y lagunas. No reutilice el envase vacío y destrúyalo en lugares apropiados para esto.

INCOMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los plaguicidas y fertilizantes, excepto con productos de fuerte reacción alcalina. FITOTOXICIDAD: No causa fitotoxicidad si se aplica a la dosis y forma de aplicación recomendada.

TIEMPO DE REENTRADA A LOS LUGARES TRATADOS:
24 horas después de la aplicación.
AGÍTESE BIEN ESTE PRODUCTO ANTES DE USARSE.
Siempre Calibre su Equipo de Fumigación.

